

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百九十

詳校官太醫院醫士 臣舒斌

編修 臣 倉聖脉覆勘

總校官庶吉士 臣何思鈞

校對官中書 臣石鴻緒

謄錄監生 臣戈廷模

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十

明周王朱橚撰

諸血門

大衄附論

夫大衄者口耳皆血出是也蓋血為榮而藏於肝氣為衛而主於肺肺開竅於鼻三者相為流通若熱氣盛則血氣因而妄行雙氣衝錯溢於上竅故鼻衄不已而口耳皆出血也

方

遠志湯

出聖濟總錄

治大衄不止

遠志

去心

天門冬

去心焙

麥門冬

去心焙

阿膠

炙燥

當歸

切燥

藕節

洗淨

甘草

炙

大黃

剉炒

芳蔚

各半兩

桂皮

去粗

沒藥

研

麻黃

去節

桃仁

浸去皮尖

炒黃各一分

牡丹皮

三分

訛胡

去苗一兩

右粗搗節每服三錢以水一盞煎至七分去滓空心

溫服

遠志散

出聖惠方

治大衄不止

遠志

半兩去心

白芍藥

三分

桂心

一分

天門冬

去心

阿膠

搗碎炒黃燥

當歸

藕節

甘草

炙微赤剉

川大

黃

炙微焦已上各半兩

沒藥

生乾地黄

柴胡

去苗各一兩

桃仁

一分去皮尖雙仁麤微炒

右為散每服三錢水一盞至五分去滓不計時候溫

服

阿膠散

出聖惠方

治大衄未止計數升不知人事

方見本門鼻衄類

以生地黄汁調服

立效散

出十便良方

治大衄

熟艾

二彈子大

牛皮膠

一兩炙黃燥

右以煎了豉汁一大盞同煎至七分去滓不計時候分溫二服之

治鼻血不止

出肘後方

右用白芨為末津調塗鼻山根上立止

生地黄飲

一名地黃湯出聖濟總錄

治大衄口鼻出血上胸心氣

急勞熱等症

方見本門吐血衄血類

黑神散

出聖濟總錄

治鼻中及耳皆出血不止

白刺蝟皮

燒灰存性半兩

人中白

半錢溺盆內積垢

右細研為散每用少許搗在鼻中

苦參散

出聖惠方

治大衄口耳皆出血不止

苦參

一兩

黃連

一兩去鬚

川大黃

剉微炒

梔子仁

栢葉

各半兩

桑耳

一兩

右為散每服三錢水一盞煎至五分去滓入生地黃

汁一合攪勻不計時候溫服

紫參散

出聖惠方

治大衄不止

紫參

一分

鬱金

半兩

子芩

一分

甘草

半分炙微赤剉

白龍骨

半兩

鹿角膠

半兩搗碎炒令黃燥

右為散每服以生薑汁并蜜水相和調下二錢

苦參湯

出聖濟總錄

治大衄口耳皆血出不止

苦參

剉

黃連

一兩去鬚

大黃

一兩炒

生地黄汁

一合

梔子

七枚去皮

右粗搗篩每服三錢水一盞入生地黄汁在內煎至

七分去滓溫服

二黃散

一名瀉心湯
旅舍傳要方

治鼻衄過多并酒齕大便閉而

有熱者蜜水調服

方見本門吐
血衄血類

栢葉散

一名側
栢散

治口鼻出血如湧泉須臾不救

方見
本門

出失
血類

又方

出聖
惠方

治大衄口耳皆出血不止

斷弓弦

一分
燒灰

白礬

一分
燒灰

右為散以二大豆許吹入鼻中瘥

阿膠湯

出聖惠方

治大衄口耳皆出血不止

阿膠

炙燥一兩

蒲黃

半兩

右粗搗篩每服二錢水一盞生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫乳隨衄左右繫之兩鼻竅俱出則盡繫兩乳不計時候一方用生地黃切煎

聖效方

出聖惠方

治鼻衄至一斗并大衄

綿

五兩

人中白

一團如鷄子黃大

右燒為灰研細每服二錢溫水調下

萊菔酒 治大衄不止

右萊菔不據多少每細剉一合用酒一盞先煎酒令百沸再下萊菔再煎一兩沸俟溫瀝去滓頓服

玉漿散

出傳信方

治大衄

右白麴不據多少每服三錢用冷水調下一方有鹽一錢

治出血不止

用紙三四層冷水浸透搭鼻梁及頂頸二處乾則再用漿水濕血即止

鼻久衄

附論

夫鼻衄者由熱乘血氣也肝藏血肺主氣開竅於鼻若臟腑勞損血氣生熱血得熱則流散妄行隨氣發於鼻者名為衄血若臟虛不復勞熱停積故衄經久不瘥也而面色不榮目昏眩冒

方

桑根白皮丸

出聖濟總錄

治鼻衄不止

桑根白皮

炙剉

山梔子

去皮殼

黃芩

去黑心

甘草

炙剉

羌活

去蘆頭

防風

去叉

當歸

切焙

訶梨勒

煨去

核

胡黃連

各一兩

地骨皮

人參

白茯苓

去皮

芎胡

去蘆頭各半兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九丸空心食前

溫酒送下

五黃丸

出濟生拔粹方

治衄血久不止大便結燥者下之

大黃

錢五

芒硝

錢三

甘草

錢一

生地黄

錢三

梔

子

錢一

黃芩

錢一

黃連

半錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大溫水下

阿膠散

出聖惠方

治血久不止

阿膠

杵碎二兩炒黃燥

桂心

當歸

細辛

各一兩

龍

骨

二兩

蒲黃

一兩

亂髮

三兩燒灰

右為細散每服以粥飲調下二錢一方有芍藥無蒲

黃

清肺飲子

一名麥門飲
出試効方

治衄血吐血久不愈

五味子

十箇

麥門冬

去心

當歸身

人參

生地

黃

各半錢

黃耆

一錢

右為粗末都作一服水二觔煎至一觔去粗稍熟服
不據時以三稜針於氣衝出血立愈

刺薊散

出聖惠方

治鼻衄久不止

刺薊

二兩

竹茹

二兩

蒲黃

艾葉

亂髮灰

白

芍藥

各一兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓入地黃汁

一合攪勻不計時候

地黃散

出濟生
拔粹方

治衄往來久不愈

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮

各等分

右為細末每服二錢蜜湯調下日三

茜梅丸

出醫方
大成

治衄血無時

茜草根 艾葉

各一兩

烏梅肉

焙乾
半兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸烏梅湯

下經云天暑地熱經水沸溢蓋血妄行陽勝陰也鞠
運判茂之嘗苦此疾予授此方令服後愈三黃散亦

得

亂髮灰散

出聖惠方

治鼻衄久不止令人目眩心煩

亂髮灰

一分

桂心

半兩

乾薑

一分
炮製

右為細末每服二錢溫漿水調下二錢先食漿水粥

後服

榴花散

出聖惠方

治鼻衄久不止諸藥不效

石榴花

暴乾

故綿灰

各半兩

人中白

一分

右同研細更入麝香一錢研均少少吹入鼻中立止

麥門冬飲子

出濟生拔萃方

治衄血不止

麥門冬

生地黃

各等分

右剉每服一兩水煎服又衄血先硃砂蛤粉之藥次木香并黃連大便結下之大黃芒硝甘草生地黃瀉軟梔子黃芩黃連可選而用之

蒲黃散

出聖惠方

治鼻衄經久不止

蒲黃

二兩

石榴花

一兩未

右和研為散每服以新汲水調下一錢

治鼻衄久不止身面俱黃

出聖惠方

赤馬通

七塊以水一盞絞汁

阿膠

三分搗碎炒令黃燥

右將馬通汁調阿膠令稀稠得所少少滴入鼻口須臾

即止

吹鼻散

出聖惠方

治鼻衄不止

緋帛灰

三錢

亂髮灰

二錢

右研細少許吹入鼻中

鉛丹散

出聖濟
總錄

治鼻久衄

右用鉛丹不據多少研如粉每服二錢發時新汲水

調下

白礬散

出聖濟
總錄

治鼻久衄

右用鉛礬各半兩燒令汁盡細研羅為末以少許吹鼻中

特效方

出危
氏方

治衄久不止

右以蒲黃血竭為末吹入鼻中

又方

右用薄荷以水煎童便用紗帛包塞入鼻中

又方

旅舍脩要方

用椶櫚燒灰隨左右鼻搐之

葉氏方

右隨衄左右以新汲水洗足

又方

右以左撚紙索子繫手第四指呪曰血神住立止

治鼻衄血久不止

出肘後方

又用桔梗為末用方寸七日四五服立止吐血下血

又方

出聖惠方

用老鴿翅闕大骨微炙搗為細末少許吹入鼻中

又方

出聖惠方

右用烏賊魚骨半兩去甲搗為細散少許吹入鼻中
即止如未便着少許乾浮萍草末吹入鼻中亦可

又方

出聖
惠方

用乾苔二兩燒灰為末少許吹入鼻中

治鼻中澀血經旬日不止

出聖
惠方

右用南牆墻衣土兩杏仁大鼻中塞之初時被血推却仍取塞之

衄衄 附論

夫內經謂膽移熱於腦則辛頰鼻淵傳為衄衄瞋目夫血得熱則涌溢得寒則凝滯膽受胃熱循脈而上乃移

於腦蓋陽絡溢則血妄行左鼻為衄在汗空為蟻二者不同皆熱厥血溢之過也今之治衄蟻者專於治血不知血之行留氣為之本猶海水潮汐陰陽之氣使然也明夫經絡逆順則血與氣俱流通而無妄行之患矣

方

地黃竹茹湯

出聖濟總錄

治衄血汗血消熱結

生地黃

切焙一觔

青竹茹

五兩

黃芩

去黑心

當歸

焙

甘草

炙

芍藥

芎藭

各三兩

桂

去粗皮一兩

釜底

下焦黃土

一塊如
鷄子大

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去

滓溫服

竹茹湯

出聖濟
總錄

治血衄汗血熱盛所致

生竹茹

生地黃

切焙

黃芩

去黑心
各二兩

蒲黃

芍藥 麥門冬

去黑心
各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後

溫服

黃蘗散

出聖濟總錄

治鼻衄汗血

黃蘗

去粗皮

葛根

剉

黃芩

去黑心各一兩半

鷄蘇

一兩

凝水石

二兩

生竹茹

半兩

右粗搗節每服三錢水一盞入生地黃半分切煎七分去滓食後臨卧溫服

白藥散

出聖濟總錄

治衄血汗出

白芍藥

二兩半

生地黃

汁三合

生藕汁

一合

生

薑汁

少許

右搗白藥為末先煎三物汁令沸每一半錢入熱水

一合白藥末一錢攪勻食後溫服一方有麥門冬汁

三合和生麥門冬煎

紫參散

出聖濟
總錄

治衄血汗血久不止

紫參 黃芩

去黑心
各一分

鬱金

甘草

炙各
半分

右為散每服三錢以生地黄汁一合白蜜一匙水一

盞同煎沸微溫調下日三

刺薊湯

出聖濟
總錄

治熱氣上行衄血汗血

刺薊

雞蘇葉

各二兩

黃連

去鬚

犀角

鎊

生乾

地黃

各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

不據時

定命散

出宣明論

治膽受熱血妄行鼻中衄衄并血汗不

止

硃砂 水銀 麝香

各等分

右為末每服半錢新汲水調下不計時候如引藥看

老幼虛實加減

鬱金散

一名金光散
出聖濟總錄

治衄血汗血

鬱金

甘草

炙

青黛

各半
兩

右為散每服二錢用鷄子調下

地黃散

出聖
惠方

治衄血汗血

方見本門
唾血類

獨聖湯

出聖濟
總錄

治血妄行或衄或蟻

右用黃芩五兩去黑心細剉如麻豆大每服七錢水

二盞煎至一盞去滓溫服一方為末酒調下如神

肺臟壅熱吐血

夫肺居膈上與心臟相近心主於血肺主於氣氣血相隨循環若臟腑久積熱毒則胸膈壅滯血與氣逆行上注於肺肺壅不利故令吐血也又有體虛勞損酒食過度憂愁思慮恚怒氣逆傷於肺者亦皆吐血不止也

方

補肺白花煎

出聖惠方

治肺壅熱吐血後欬嗽勞劣

白蜜

合五

生地黃汁

合五

生薑

合一

黃牛乳

合五

藕汁

合三

秦艽

去苗一兩

白茯苓

一兩

紫苑

去苗一兩

乾柿

五枚煮軟細研如糊

杏仁

二兩湯浸去皮尖雙仁楚炒微黃

黃明

膠

四兩搗碎炒令黃燥

右為細散與蜜及諸藥汁兼乾柿同於銀鍋子內以

慢火煎成膏別藏於瓷器中每服不計時候以粥飲

調下一茶匙

蒲黃散

出聖惠方

治肺壅熱氣逆吐血

蒲黃

錢三

當歸

劉微炒

人參

去蘆頭

天門冬

去心焙

麥門冬

焙去心

甘草

生用

赤芍藥

各半兩

黃耆

一兩

阿膠

搗碎炒令黃燥

生乾地黄

各一兩

右為細末每服不計時候以粥飲調下一錢

天竺黃散

出聖惠方

治肺臟壅熱吐血心膈煩悶

天竺黃

人參

側柏葉

焙

大黃

剉炒

犀角

鎔

黃耆

剉焙

赤茯苓

去黑皮

馬兜鈴

焙各半兩

鹿角

膠

炒燥一兩

右為散每服一錢煖生地黄汁調下不據時

刺薊散

出聖惠方

治肺壅熱吐血不止

刺薊

川升麻

鹿角膠

搗碎炒令黃燥

羚羊角

青竹茹

當歸

剉微炒各半兩

生乾地黄

一兩

甘草

一分
生用

右為散以水二大盞半煎至一盞半去滓分溫五服

不計時

鷄蘇散

出聖惠方

治肺臟壅熱痰唾內有血咽喉不利

鷄蘇莖葉

赤茯苓

半夏

湯洗七遍去骨

桔梗

去蘆頭

黃耆

劉各一兩

甘草

半兩炙微赤劉

生乾地黄

二兩

麥門

冬

一兩半去心焙

右為散每服五錢以水一大盞入生薑等分煎至五

分去滓食後溫服

五汁湯

出聖惠方

治肺壅熱極肺脹吐血不止

生藕汁

生地黃汁

刺薊根汁

牛蒡根汁

生薑汁

生蜜

各一合

右和令勻每服一小盞不計時候溫服一方無生薑

汁

白茅根散

出聖惠方

治肺臟熱壅滯唾血

桑根白皮

二兩剉

白茅根

剉

黃芩

紫苑

洗去土各

一兩

犀角屑

三分

刺薊根

一兩半

右為散每服四錢以水一中盞入竹茹一分煎至五分去滓入生地黃汁一合更煎三兩沸每於食後溫服

地榆散

出聖惠方

治心肺熱盛吐血不止

地榆

剉

甘草

剉生用各半兩

栢葉

吳藍

黃芩

各三兩

刺薊

一兩

右為散每服四錢以水一中盞入青竹茹一分煎至六分去滓每服食後溫服

紅藍花散

出聖惠方

治肺壅熱吐血不止

紅藍花

一兩

犀角屑

茅根

剉

麥門冬

去心各三分

伏龍肝

半觔以水五大盞浸濾取汁

右為散每服三錢以伏龍肝散水一盞入竹茹一分煎至六分去滓不計時候溫服一方入亂髮灰一錢

和勻服

伏龍肝散

一名明膠散
出聖惠方

治肺壅熱極肺脹吐血不止

黃明膠

搗碎炒
微黃燥

桑葉

各一兩

伏龍肝

一兩半

右為細末每服不計時候以糯米粥飲調下一錢

紅藍花散

出聖惠方

治心肺熱極吐血不止

紅藍花

二兩

伏龍肝

一合

甘草

半兩
生用

右為細末每於食後煎竹茹湯調下二錢

吐血後虛熱胸中痞口燥

附論

夫上焦有邪則傷於臟臟傷則吐血人病吐血之後榮
衛俱虛陰陽否隔陽氣不降故身體虛熱胸中煩悶而
口舌乾

方

補肺湯

出聖濟
總錄

治吐血後胸中痞痛口燥不喜食

黃耆

細剉

桂

去粗皮

生乾地黃

焙

赤茯苓

去黑皮

厚朴

去粗皮生薑汁炙

紫苑

去苗土

當歸

切焙

陳橘

皮

湯浸去白焙乾用

五味子

各二兩

遠志

去心

麥門

冬去心

焙

甘草

炙

鍾乳

研成粉

白石英

研成粉

桑白皮根

剉炒各一兩

人參

一兩

右粗搗篩再入研藥同和勻每服五錢以水一盞半

大棗二枚劈破同煎至一盞去滓溫服日二夜一

地黃湯

出聖濟總錄

治心肺壅熱上焦不利吐血胸中痞

口乾

生地黃

乾

地骨皮

赤茯苓

去黑皮

甘草

炙

大黃

濕紙裹煨剉

元參

黃芩

去黑心

當歸

切焙

麥

門冬

去心 焙

藿香

取葉

升麻

紫苑

去苗 土

桑根

白皮

剉各 一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

不據時

當歸湯

出危 氏方

治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從

三焦起或因熱損發或因酒食發悉主之

當歸

乾薑

炮

熟地黃

藥皮

小薊

羚羊

角

阿膠

炒各三 錢三字

白朮

芍藥

各半 兩

黃芩

甘草

炙各一分

右劉為散每服三錢水二盞竹茹一塊如指大煎至八分去滓入伏龍肝半錢頭髮灰半錢蒲黃半兩又煎至七分不據時候一方無白朮

茯苓湯

出聖濟總錄

治吐血後身體虛熱胸中痞隔口舌

乾燥

赤茯苓

去黑皮

黃連

去鬚

生乾地黃

焙

梔子

仁黃芩

去黑心

大黃

剉炒各一兩

桂

去粗皮

瓜蒌

根各三分

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不據時

溫服

栢藥散

出聖濟總錄

治吐血後胸中痞口乾及嗽

栢藥焙

蒲黃各一兩

木香

烏魚骨

去甲炙

椶

皮當歸

切焙各半兩

阿膠

炙燥一兩

婦人油髮

與椶皮同

燒灰

半兩

右為細散每服一錢用糯米粥飲入地黃汁少許煖

令溫調下不計時候服一方冬溫夏冷調之

鹿角膠散

出聖濟總錄

治吐血後虛熱胸中痞口燥

鹿角膠

炙燥

阿膠

炙燥

秦艸

去苗土

烏梅

去核炒各等分

右為細散每服二錢糯米飲溫調下早晚食後臨卧服

抵聖湯

出聖濟總錄

治男子婦人吐血後隔虛熱

陰地蕨

紫河車

劉

管仲

甘草

炙劉各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫

服

阿膠散

出聖濟總錄

治吐血後上脘痞隔虛熱口燥

阿膠

炙燥

生乾地黃

焙

黃蘗

去粗皮蜜炙各半兩

右為細散每服二錢用綿灰蜜湯調下日三服

人參散

出聖濟總錄

治吐血後虛熱胸中痞口燥

人參

二兩

阿膠

炙令燥一兩

甘草

炙剉半兩

黃耆

細剉二兩半

右為細散每服二錢溫糯米飲調下不據時候

茜草丸

出聖濟總錄

治吐血後虛熱躁渴及解毒

茜草

劉

雄黑豆

去皮

甘草

炙劉各等分

右為細末井花水和丸如彈子大每服一九溫熱水化下不據時候

神效散

治吐血後虛熱胸中痞口燥

方見本門吐血類

嘔血

附論

夫憂愁思慮則傷心悲悶怒氣逆上而不下則傷肝蓋心主血肝藏血二臟俱傷則血不循經隨氣上逆故因嘔而血出也內經曰怒則氣上甚則嘔血

方

款冬花丸

出聖濟總錄

治吐血唾血欬逆氣喘短氣

款冬花

紫苑

去苗土各三兩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

豉

炒各

二兩半

人參

桂

去粗皮各半兩

天門冬

去心焙

甘草

炙

蜀椒

合口炒出汗

栢葉

去梗焙

生乾地黃

焙各三分

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一九冷熟水嚙下

日三夜二服

伏龍肝散

出聖惠方

治嘔血不止胸膈煩痛心氣逆

伏龍肝

二兩

桂心

當歸

赤芍藥

白芷

芩

窮

甘草

炙微赤剉各一兩

細辛

半兩

生乾地黃

四兩

阿膠

二兩搗碎炒令黃燥別杵為末

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓放溫入阿膠末一錢攪勻每於食後服之一方治吐血有竹茹無阿膠

竹茹散

出聖惠方

治嘔血久不差心神煩悶臟腑勞傷

竹茹

一團如雞子大

白芍藥

當歸

生乾地黃

各半兩

羚羊角屑

鹿角膠

麥門冬

去心焙各一兩半

甘

草

一兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

黃耆散

出聖惠方

治傷中胸裏攣痛欬嘔血出時作寒熱

小便赤黃此是勞傷所致

黃耆

剉一兩半

桂心

一兩半

阿膠

搗碎炒令黃燥

生乾地

黃當歸

遠志

去心

人參

去蘆頭

大麻仁

桑

根白皮

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

澤蘭湯

出千金方

治傷中裏急胸脇攣痛欲嘔血時寒時熱小便黃皆傷於房勞故也

澤蘭

糖

各一觔

桂心

桑根白皮

人參

各三兩

遠志

二兩

生薑

五兩

麻仁

一觔

右咬咀以淳酒一斗五升煮取七升去滓內糖食前

服一升日三夜一勿勞動

麥門冬汁

出聖濟總錄

治嘔吐血及鼻衄

生麥門冬汁

生地黄汁

生藕汁

冷熱水

各盞

白藥

一兩為末

右合和勻每服二盞略煎沸溫服不據時

澤蘭湯

出聖濟總錄

治傷中胸內急痛欬嗽嘔吐血時寒

時熱小便黃赤

澤蘭葉

六兩

大黃

劉炒

遠志

去心各一兩

人參

三兩

麻仁 桑根白皮

劉各四兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓冷服

不據時

生地黃湯

出千金方

治憂恚嘔血煩滿少氣胸中痛

生地黃

一觔

大棗

五十枚

阿膠

甘草

各三兩

右㕮咀以水一斗煮取四升分四服日三服夜一服

四味丸

一名四生丸余居士選奇方

治嘔血吐血衄血若陽乘陰

血熱妄行宜服此藥

方見婦人諸疾門吐血類

治憂恚嘔血煩滿少氣胸中疼痛

出本草

用百葉搗羅為散不計時候以粥飲調下二錢

荊芥飲

出聖濟總錄

治嘔血不止

荊芥穗

梔子仁

黃芩

去黑心

蒲黃

各一兩

右粗搗篩每服三錢水盞煎至七分去滓冷服不據

時候

阿膠散

出經驗良方

治肺損嘔血開胃

阿膠

三筒好者炒

木香

一錢

糯米

一合半

右為細末每服一錢百沸湯點不據時

羚羊角飲

出聖濟總錄

治卒嘔血

羚羊角

銔一兩半

桂

去粗皮二兩

大黃

剉炒一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞半煎至一盞去滓冷服

不據時

刺薊散

出聖惠方

治嘔血頭痛壯熱徧身疼痛四肢煩悶

刺薊

青竹茹

各一兩

鷄蘇葉

白茯苓

各半兩

麥門冬

一兩半去心焙

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓入地黃汁一合攪勻不計時候溫服

鬱金散

治嘔血

方見本門吐血類

五靈脂餅子

出聖濟總錄

治吐血嘔血

五靈脂

一兩

蘆薈

二錢

右為末滴水和丸如鷄頭大捏作餅子每服二餅龍腦漿水下不據時候服

赤芍藥湯

出醫方大成

治瘀血蓄胃心下脹滿食入即嘔

血名曰血嘔

赤芍藥

二兩

半夏

一兩半湯
泡七次

陳皮

一兩

右吹咀每服四錢水一盞半薑七片煎至七分溫服

不據時候

阿膠湯

出聖濟
總錄

治嘔血煩悶少氣胸中痛

阿膠

炙令
燥

甘草

炙一
兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞入生地黃汁三合同煎
至七分去滓溫服不據時

大薊飲

出濟生方

治嘔血吐血

大薊汁

生地黄汁

等分

右和勻入薑汁少許生蜜少許攪勻冷服不據時候

荊芥湯

出聖濟總錄

治嘔血

方見本門吐血類

治嘔血

出本草

以黃蘗好者蜜塗炙乾杵為末用麥門冬熟水調下

二錢匕立差

生薑竹茹湯

出指南方

治嘔血

竹茹 甘草 川芎 黃芩 當歸 白朮

各一兩半

芍藥 官桂 人參

各一兩

右為末每服五錢水二盞薑十片煎一盞去滓服

治嘔血

出本草

取鰾膠長八寸濶二寸炙令黃刮二錢已來用蔗節三十五箇取自然汁調下

治憂恚嘔血煩悶少氣胸中疼痛

右用荊芥為末不據時候以生地黃汁調下二錢

唾血附論

夫邪熱熏於肺則損肺恚怒氣逆傷於肝則損肝肺肝傷動令人唾血如唾中有若紅縷者屬肺如先若脇下痛而唾鮮血者屬肝可拆而治之肺為五臟之華蓋其體輕虛怕熱而惡寒則易為傷損也若或邪熱之氣伏留在臟傷於經絡致榮衛否澀胸膈壅滯故令吐血也且唾一證不嗽者易治兼嗽者為難愈唾中帶紅絲者難治謂肺傷故也醫經云便血猶可止欬血不易醫喉

不停物毫髮必欬血滲入喉愈滲愈欬愈欬愈滲飲溲
溺者十無一死服寒涼者百無一生以此觀之寒涼之
劑不宜過進也

方

大阿膠丸

出濟生拔萃方

治唾血嗽血

阿膠

微炒

卷栢

生地黃

熟地黃

大薊

獨者日乾

鷄蘇葉

五味子

各一兩

栢子仁

另研

茯苓

百

部遠志

人參

麥門冬

防風

各半兩

乾山

藥

右為細末煉蜜為丸彈子大濃煎小麥并麥門冬湯
嚼下一丸食後若覺氣虛不可服衛生寶鑑方
無熟地黄

紫苑散

出聖濟
總錄

治肺氣內傷邪熱熏積欬唾有血

紫苑

去苗
土

款冬花

當歸

切
焙

桂

去粗
皮

芎藭

五味子

炒

附子

炮製
皮剉

細辛

去苗
葉

貝母

去
心

栢葉

炒

白朮

甘草

炙
剉

生乾地黄

焙

杏仁

湯浸去皮尖并
雙仁炒各一兩

右為散每服三錢蜜湯調下日三服不拘時

羊肺湯

出聖濟總錄

治肺傷唾血

鍾乳粉

三兩

半夏

生薑同搗作餅曝乾半兩

桂

去粗皮

白石

英

辟

射干

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒

貝母

去心

陳橘

皮

去白焙

百部

切

五味子

炒

款冬花

甘

草

炙判

厚朴

去粗皮生薑汁炙各一兩

右麤搗篩每服三錢用水二盞煮羊肺一兩至一盞

去肺入藥末煎取七分去滓溫服日三夜一

雞蘇散

出醫方大成

治勞傷肺經唾內有血咽喉不利

雞蘇葉

黃耆

去蘆

生地黃

洗

阿膠

蛤粉炒

白

茅根

各一兩

桔梗

去蘆

麥門冬

去心

蒲黃

炒

貝

母

去心

甘草

炙各半兩

桑白皮

半兩

右以咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓

溫服不據時候一方無桑白皮

石膏散

出千金方

治噫止唾血

石膏

四兩

厚樸

三兩

麻黃

生薑

五味子

半夏

杏仁

各二兩

小麥

一升

右咬咀以水一斗煮麻黃去沫澄取七升內藥煮取

二升半分再服

前胡湯

出聖濟總錄

治肺傷唾血

前胡

去蘆頭二兩

小麥

茅根

剉

麥門冬

去心焙

麻黃

去根節

石膏

碎

甘草

炙剉各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑汁地黃汁各半

兩合用煎至七分去滓溫服

礬石丸

出聖濟總錄

治憂恚氣逆肝氣不足唾血不止

礬石丸

令枯

生乾地黄

焙

乾薑

炮裂

桂

去粗皮

皂莢

炙焙刮去皮并子

桔梗

剉炒

附子

炮裂去皮臍各一兩

石為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫水下

日三

石膏散

出聖惠方

治唾血不止胸膈氣悶

石膏

四兩

麻黃

去根節

五味子

鷄蘇莖葉

半夏

湯浸七遍去骨各二兩

杏仁

三兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分小麥五十粒煎至五分去滓每於食後溫服

天門冬丸 治咯血

天門冬

去心

青黛

晒乾各四錢

生蒲黃

油髮灰

各一錢

川薑黃

一錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每五十丸入松陽柿中濕紙包煨香候冷桑白皮煎湯臨卧嚼下柿能戀肺咯血屬肺嘔血屬脾

黃耆散

出醫方大成

治咯血成勞肌體消瘦眼睛疼四肢

倦脚無力

黃耆

蜜炙

麥門冬

去心

熟地黃

桔梗

炒

白芍

藥

各半兩

甘草

炙一分

右為粗末每服四錢水鍾半薑三片煎七分溫服此

藥稍涼有熱者可服

團參散

出濟生方

治唾血嗽咳服涼藥不得者

人參

黃耆

蜜水炙

飛羅

各一兩

百合

蒸半兩

為細末每服二錢食後用白茅根煎湯調服茅花煎湯亦可

綿灰散 治勞傷肺經咯血吐血諸方不愈

綿灰

三錢

麝香

少許

青黛

三錢

蛤粉

三錢

右為末小薊湯調服如無燈心湯調服

白前湯

出聖惠方

治肺熱唾血日夜不止

白前

桑根白皮

剉

桔梗

剉炒各二兩

甘草

炙剉一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不據時

候溫服

阿膠地黃湯

出聖惠方

治熱傷肺臟唾血不止

生乾地黃

四兩

阿膠

搗碎炒令黃燥

蒲黃

各二兩

右為散每服三錢以水一中盞入竹茹一鷄子大煎至五分去滓每服食後溫服一方衄血汗血用糯米

飲無竹茹

錦節膏

出濟生方

治唾血嘔血

真錦灰

藕節灰

各半兩

滴乳香

一錢別研

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一九食後及臨
卧噙化蓋藕節灰大能破血也

豆蘇湯

出直
指方

上焦有熱咯血瘀血煩悶燥渴

黑豆

合二

紫蘇葉莖

修二

烏梅

兩箇

右水一大碗同煎臨熟入薑汁三大匙食後旋服

五加皮散

出經驗
良方

治久嗽咯血癆瘵骨立羸弱欲死

者

椿頭根

新握者剉
即椿樹

五加皮

新空
剉

用無灰酒煮去滓飲酒神効

黃藥散 治咯血

方見本門
吐血類

生地黄飲

出聖濟
總錄

治肺肝內傷卒唾血

生地黄

搗絞
取汁

阿膠

二兩每片
如兩指大

右每以膠一片入地黄汁一盞內飯甑蒸之取出放

溫服

六一散

出朱氏
集驗方

治咯血發寒熱

黃耆

六兩
炙

甘草

一兩
炙

右為細末如常服點不拘早晚乾喫亦得

治咯血

出經驗良方

趙君獻云屢用效

用薏米

即薏苡仁

不計多少為末熟煮猪胰切片蘸藥食後微空時取食之蓋薏米能補肺猪胰導入經絡耳陳敏捷云治肺癰唾濃血薏米為末米飲調下一方搗碎米煎服

香附子散

出百一選方

治肺破咯血

用香附子去皮毛為細末以米飲調下

地黃煎

治憂患絕傷唾血胸脇疼痛

方見本門吐血類

蒲黃散

出聖惠方

治唾血不止

用蒲黃一兩研碎每服三錢冷水調下不據時候溫酒服亦可一方藕節煎湯服

桂心散

治唾血

方見本門吐血類

白芨散

出朱氏集驗方

治咯血嘔血肺損或食飽負重而得

者服之

用白芨為末米飲調服又治鼻衄雪水調或新汲水

調服台州獄吏憫一大囚將死頗照顧之因感吾之
語七次犯死罪盡力抗諱苦遭訊拷坐是肺皆撈損
至於嘔血適得一藥每用其效如神荷君庇護之恩
特此以報只白芨一味米飲調下餌其後凌遲劊者
剖其胸見肺間竅穴數十處皆白芨補填之色猶不
變洪貫之聞其說為郢州長壽宰規之赴洋州任一
卒忽苦咯血勢絕危貫之用此救之一日而止

血竭散 治一切傷力咯血

人參 血竭 款冬花 鷄管石 甘草

右等分研為極細末先取生薑自然汁另以蠶盛之以蘆筍微微吸藥末入喉中次吸生薑汁少許送下忌濕麪魚腥生冷之物

茯苓補心湯

出如宜方

治心氣耗不能藏血五心煩熱咳

嗽唾血

木香

枳殼

桔梗

甘草

炙

陳皮

製各半兩

蘇葉

乾葛

半夏

製

前胡

人參

茯苓

各七錢半

右咬咀薑七片棗一枚煎氣盛者去木香以參蘇飲
對四物湯名茯苓補心湯治咳嗽有血本方又治婦
人妊娠阻惡

久嗽咯血

出永類
鈴方

白匾豆

半兩

生薑

半兩

枇杷葉

去毛

半夏

製

人參

各一分

白茅根

三分

右煎檳榔湯服不計時分

聖餅子

出業陀中
藏經方

治咯血

青黛

錢一

杏仁

四十粒去皮次黃明膠煎黃色取出細研

右同研勻却以所煎膠少許鎔開和捏作錢大餅子每服用乾柿子一箇中破開入藥一餅合定以濕紙裏慢火煨熟取出以糯米粥嚼下

又方

出朱氏集驗方

治咯血

右用烏梅不計多少煎湯調百草霜一服愈

槐花散

出朱氏集驗方

治咯血失聲

右槐花炒為末用糯米飲調服二服仰臥

治唾血

出本草

右取桂心搗作末以水下方寸匕

九竅四肢指岐間出血

附論

夫榮衛大虛腑臟傷損血脈空竭因其恚怒失節驚忿過度暴氣逆溢致令腠理開張血脈流散也九竅出血喘欬而上氣其脈數有熱不得卧者難治也

方

黑散子

出直指方

凡諸竅出血並主之

隔年蓮蓬

敗櫻櫚

頭髮

並燒存性等分

右為末每服二錢煎楠木香湯調下或只用櫻櫚燒灰米湯調下亦可

竹茹地黃湯

出聖惠方

治九竅四肢指岐間出血方

青竹茹

蒲黃

各半兩

生地黄

一兩細切

右吹咀以水一大盞煎至六分去滓食後溫服

蒲黃散

出聖惠方

蒲黃

微炒

龍骨

燒赤各一兩

右為細散每服以糯米粥飲調二錢服之

治七孔出血

出經驗良方

右牛脂芳又名牛腹芳切為粗末每服一勾水瓦器煎不用鐵器去滓連服以紗帛蓋頭頂上仍將稗心扎小脂根男左女右

治人有九竅四肢脂岐間皆血出此暴驚所致勿令患

人知

出聖惠方

以井花水猛噉其面治衄如神

荊芥湯

治九竅出血

方見本門吐血類

又方

出直指方

治暴驚風九竅出血其脈虛者

用靈砂百粒分三次人參煎湯下

治耳鼻口中出血不止

出經驗良方

用赤馬糞燒灰溫酒調下一錢或和水絞取汁每服

一小盞頻服之

又方

出聖惠方

取新生犢子未草墮地臍尿曬乾燒灰為末服方寸

匕日四五服

又方

出聖惠方

用生地黃汁一升生薑汁一合相和溫服一小盞日

四五服

治九孔出血

出千金方

用搗荊葉汁酒服

二合一本作荊芥

治九孔出血

出肘後方

以刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頓服之如無青

汁只搗乾者為末冷水調三錢

血妄行

附論

凡病者諸血積聚合發為衄而清氣道閉濁道滂溢凝
停胸胃中因即滿悶吐出數斗至於一石者名曰內衄
或因四氣傷於外七情動於內及飲食房勞墜墮傷損
致榮血流聚膈間滿則吐溢世謂妄行

方

必勝散

出醫方
大成

治男子婦人血妄流溢吐血衄血嘔

血咯血并婦人下血過多致發虛熱調血則熱自不
作又用心過度發熱當以參蘇飲二分四物湯一分
用之

小薊

并用根

蒲黃

微炒

熟地黄

洗

芎藭

當

歸

去蘆

人參

去蘆

烏梅

去核各一兩

右吹咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服不

據時

藥皮湯

出朱氏集驗方

治血常失道暴出色鮮燥引飲

大藥皮

梔子

各一兩

甘草

半兩

右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓服

地黃五味丸

出百一選方

治妄行吐血

生地黃

熟地黃

五味子

各二兩

為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸一日三

度空心用好酒送下

地黃散

出經驗良方

治血經妄行及鼻衄不止

生乾地黃

龍腦薄荷

各二兩

甘草

生用一兩

為末每服一二錢食後新汲水調下

蒜連丸 治諸血妄行

黃連

日乾研為末七

獨頭蒜

一顆煨熟取肉研細

右入米醋些子搗和丸如梧桐子大日乾每三四十丸陳米飲送下

金屑丹

出三因方

治三因吐血及衄血下血一切血溢妄

行

用雌黃須葉子者為粗末入棗肉線繫定漚着湯煮

用黑錫對雌黃觔兩鎔作汁傾入湯煮一日添湯候冷取出雌黃洗淨乾研為細末却以煮藥棗肉和丸如梧桐子大每服五七丸黑錫煎湯下

治妄行吐血

出經驗良方

用熟地黄洗去土焙乾為細末用好真金墨新汲水磨半盞許分作二服調熟地黄末服之墨須松烟者張裁衣其子病服此即止屢作屢效

石灰散 治吐血妄行

以石灰刀頭上燒用井花水調下後用扁柏葉同焙前
草根研自然汁咽下

治血妄行

用牛口蘇連根掘起洗淨於石臼中椿細用生薑數
片絞汁或井花水多用熱酒調服將此滓盪於腦
隨即便愈

歸脾湯

出危氏方

治思慮傷脾心多健忘為脾不能統攝

心血以致妄行或吐血下血

白朮 茯神

黃耆

酸棗仁

炒去殼

龍眼肉

各兩

人參 木香

各半兩

甘草

二錢半

右剉散每服水一盞薑五片棗一枚煎不據時候溫

服

南天竹飲

出聖濟總錄

治血妄行九竅皆出服藥不住者

南天竹草

生瞿麥如搗指大一把剉

山梔子

三十枚去皮

生薑

一塊如指大

大棗

五枚去核

甘草

炙半兩

燈草

如小指大一把

右剉入瓷器中水一大碗煮至半盞去滓通口服

大效黃耆湯

出衛生家寶方

治諸血妄行

綿黃耆

打扁二寸許切以湯泡蜜一大匙浸半日控乾焙黃色一兩

官桂

八錢

去粗皮

川當歸

用生地黃汁浸焙乾汁多猶妙

白芍藥

以童子小

不見火

便浸少時

敗龜殼

一兩蘸醋炙七次并黃色用

茅花

八錢生用

焙乾一兩

人參

八錢紫葢者焙乾

大薊

一兩旋取洗焙用

白茯苓

八錢米泔

淨去紅

蒲黃

半兩銀器中炒黑紫色用

伏龍肝

半兩

甘草

絲焙乾

一分

炙

右咬咀每服五錢二小盞酒少半盞煎九分放溫併

三服妙

順氣散

出衛生家寶方

治氣弱不正血氣欲妄行覺喉間血

腥微微咯出唾中帶些紅色

當歸

一兩洗淨去蘆細切

川芎

二兩細切

木香

四兩細切

陳皮

二錢洗去白焙細切

大薊

野生荊芥紅花者乾溫皆可用

右為末每服四錢水一盞紫蘇葉煎七分去滓溫服

不據時候

土馬駿湯

出聖濟總錄

治心肺蘊熱或恚怒氣逆使血妄

行日夕不止

土馬駿

焙乾
二兩

枳實

去穰
麩炒

白茯苓

去黑
皮

甘草

炙
劉

秦艽

去苗
土

芫胡

去
苗

人參

生乾地黃

焙
各

一
兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

汗血

附論

內經言藏真通於心血脈之氣行焉又曰肝藏血人卧

血歸於肝蓋血雖藏於肝而心則行之也若肝心二藏俱傷於邪故血隨心液為汗而出

方

人參湯

一名竹茹湯
出千金方

治汗心傷邪血汗

人參

桂皮去粗

甘草

炙

白朮

白芍藥

各一兩

黃芩

去黑心

川芎

當歸

切焙

淡竹茹

各二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

據時

竹茹湯

出聖濟總錄

治吐血汗血尿血

淡竹茹

人參 芍藥

桔梗

炒剉

生乾地黄焙

當歸

切焙

甘草

炙剉

桂

去粗皮

芫花

各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓不據

時溫服

神白散

出聖濟總錄

治血汗從膚腠出及鼻衄五七日不

住

右用人中白不計多少刮在新瓦上用火逼乾研令

極細每服二錢入麝香少許溫酒調下一方治鼻衄
不止用麝香少許每次入鼻中立差

如聖散

出聖濟
總錄

治血汗

用都李仁去皮尖研細每服一錢研鵝梨汁調下

血餘散

治汗血

方見本門
吐血類

治血自皮膚間濺出

出百一
選方

以煮酒埃上紙碎搥如楊花用手捏在出血處即止

治肌衄乃腿上血出

用胎髮燒作灰填之即止一方吹入鼻中

諸失血附論

夫諸陽統氣諸陰統血陰勝則陽虧而陽盛陽病則陰虧而陰病陽病侵陰血失常道故或吐或衄或從口鼻若暴出而色鮮心煩躁悶時欲引飲至一二升或至一斗陽入於陰以血得熱則流散如天地之經水天暑地熱則經水沸溢而湧起故有內衄肺疽其証大同而小異吐血嘔血唾血三者謂失血也

方

大阿膠丸

出醫方大成

治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫

或有鮮血并勞傷肺胃吐血嘔血並皆治之

麥門冬

去心半兩

乾山藥

熟乾地黄 五味子

各二兩

遠志

去心一分

丹參

貝母

炒

防風

去蘆各半兩

阿

膠

炒一兩

茯神

去木

栢子仁

百部根

人參

杜仲

炒各半兩

茯苓

一兩

右為末煉蜜丸如彈子大小一盞煎六分和水滓服每

服一丸

當歸地黃湯

出宣明論

治嗽血衄血大小便血或婦人經

水不調月水過多喘嗽

當歸

半兩

芍藥

川芎

白朮

染槐子

黃藥

子

各半兩

生地黃

一兩

甘草

茯苓

去皮

黃芩

白龍骨

各一兩

右為末每三錢水一盞煎七分去滓食前溫服一方

無甘草

龍腦鷄蘇丸

出危氏方

除煩解惱下熱肺熱咳嗽衄血吐

血血崩血淋解酒毒膽疽等證并止渴除驚涼上膈

鷄蘇葉

淨一兩

真蒲黃

二兩炒

木通

一兩

阿膠

二兩炮

炙甘草

一兩半

生地黄

六兩為膏

人參

黃耆

各二兩

麥門冬

二兩去心

柴胡

二兩同木通二物一處水半升浸二宿取汁入膏

右為細末好蜜二觔先煉二沸下生地黄末不住攪

時時入木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦將餘藥末

同和丸芡豆大每服二十九嚙破溫水下如虛勞煩

熱消渴驚悸煎入人參湯下如欬嗽血衄吐血麥門
冬湯下並食後如血崩淋疾空心服諸淋車前子湯
下一方丸如梧桐子大每服三十丸食後服敗毒散
吞之差

敗毒散

出危氏方

治肺熱胸中鬱熱衄血兼治血淋吐血

口臭並皆治之

方見傷寒門傷寒過經不解類

右加桑白皮麥門冬煎吞鷄蘇丸

生地黃散

出濟生拔粹方

治諸見血無寒下血衄血吐血溺

血皆屬於熱

生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮 天門冬

黃耆 芍藥 甘草 黃芩

各等分

為粗末每服一兩水煎服微身涼惡風每一兩加桂半錢

人參湯 治吐血血汗大小便下血

方見本門吐血類

膠艾散

出千金方

治上焦熱膈傷吐血衄血或下血連日

不止欲死並主之

艾葉

竹茹

各一升

阿膠

如手掌大

乾薑

二兩

右咬咀以水三升煮取一升去滓內馬通汁半升者取一升頓服又取新馬尿與少水和絞取汁一方不用竹茹乾薑作七服

黃耆膏子煎丸

治除煩解勞去肺熱欬衄心熱驚悸

脾胃熱口乾吐血肝膽熱液出口若腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴而血滯五淋血崩等病

人參 白朮

各一兩

柴胡

黃芩

各一兩

白芷

智母

各半兩

甘草

炒半兩

鱉甲

一箇酥炙

右為細末黃耆膏子九梧桐子大每服三十五十九
百沸湯下空心服又用黃耆半觔粗末以水二斗熬
一斗去滓再熬令不住攪成膏至半觔入白蜜一兩
飭一兩熬蜜飭熟得膏十兩冷丸藥

芍藥竹茹湯

出干金方

凡吐血衄血溺血藏氣虛膈氣傷

或起驚悸治之

生竹皮

一升剉

芍藥

黃芩

各一兩

芍藥

當歸

切 桂心 甘草

右咬咀以水一斗煮竹皮減三升下藥煎取二升分

三服

寧志膏

出如
宜方

治出血失血過多心神不安睡卧不得

語言失志

人參 酸棗仁

各一兩

辰砂

半兩

右為末蜜丸如彈子大每一丸薄荷湯下宜燈心湯

調琥珀末下

側柏散

一名栢葉散
出經驗良方

治內損吐血下血或因酒太過

勞傷於內血氣妄行其出如湧泉口鼻皆流須臾不救則死服此即安

栢葉

一兩半
蒸乾

人參

去蘆

荊芥穗

燒灰各
一兩

右為末每服三錢入飛羅麪二錢伴和新汲水調如稀糊相似啜服立效又方用百草霜川白芷研為末每服三錢濃米飲併服

單方

出朱氏
集驗方

治嗽血咳血

用小兒胎髮燒灰麝香酒調下每箇小兒胎髮作一服婦人病用男子胎髮男人病用女胎髮

黑神散

出經良方

治傷損大吐血或因酒食飽抵頭掬

損吐血至多并血妄行口鼻俱出但聲未失無有不效

百草霜

蚌粉

一方不必用蚌粉 百草霜即鍋底灰又名鍋墨可用鄉人家燒野草鍋底上

黑灰名曰

百草霜也

右等分為末每服二錢用糯米飲調下側栢枝研汁

尤妙遇鼻衄搐一字皮破灸瘡出血舌上出血並乾
摻上立止

秋蓮散

一名恩袍散

治吐血嘔血咯血

蒲黃 敗荷葉

晒乾各一兩

右為細末每服三二錢桑栢皮湯調下

黃耆湯 治吐血或因酒食飽低頭掬損吐血至多并
血妄行口鼻俱出但聲未失無有不效

枳實

三十箇炒為末

黃耆

二兩

甘草

半兩

紅棗

三十箇同枳實

末搗爛慢
火焙焦

右為末用米飲調二錢食後服

生犀散 治一切積毒伏熱吐血衄血嘔嗽咯血傷寒
雜病下血皆可服

升麻_{二兩} 鬱金_{半兩}

大黃 甘草_{各一兩}

右為細末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服
無時

三皇補血湯

_{出衛生寶鑑方}

治六脈俱大按之空虛必面赤

善驚上熱乃手少陰心之脈也此氣盛多而亡血以
甘寒鎮墜之劑瀉火補氣以墜氣浮以甘微苦酸補
其血

熟地黃

二錢

生地黃

三錢

當歸

一錢半

柴胡

一錢半

白芍藥

半兩

牡丹

一錢

川芎

二錢

黃耆

一錢

升麻

一錢 補之以防血溢止渴

右咬咀如麻豆大每服半兩水二盞煎至一盞去滓
稍熱食前服兩寸脈兩頭有中間全無而虛芤血在

上焦或衄血或嘔血以犀角地黃湯

方見傷寒門
傷寒摘血類

治吐血及下血并婦人漏下

出肘
後方

用水蘇莖葉煎取滓飲之

治吐血蠱毒痔血女子腰腹痛大便後出清血者

出千
金方

又取東向蘘荷根搗絞取汁二升頓服立差

治吐血鼻衄傷風血崩

用醋淬赭石為末湯調下

治血不止

以蒸餅兩三箇樵子不據多少將蒸餅食盡樵子去
殼研碎末不計時候白湯下每服三錢日進三五服
血餘散 治諸血不止

用白茅花燈心各一握新汲水煎湯下若血淋婦人
髮更好加海金沙佐之切不得用百草霜蓮蓬止澁
之劑

地黃煎

出朱氏
集驗方

治咯血嘔血嗽血

生地黃

沉水者取
汁二升

生藕

取汁
一升

生薑

四兩取
自然汁

真酥

三兩

人參

一兩為細末

阿膠

一兩微炒為末

右先將地黃藕汁薑汁同阿膠末入石器內慢火熬候稍稠即入參末熬少時入真酥熬攪勻稠得所每服一彈子太早晨日中臨卧含津嚥或以麥門冬湯下亦得

治無故遺血

用亂髮及甲燒灰酒服方寸匕

生血地黃百花丸

出衛生家寶方

治諸虛不足妄下血咯血

衄血腸癖內痔虛勞寒熱肌肉枯瘦等疾

生地黃

十觔洗白
中搗取汁

生薑

半觔

藕

四觔搗
取汁

白沙

蜜

四兩

無灰酒

一升

右以上五味用銀器或沙鍋內熬取二碗許漸成膏
一半磁器收之一半入乾山藥末三兩再熬一二十
沸次入後藥

全當歸

焙

熟地黃

焙

肉蓯蓉

酒浸
焙

破故紙

阿膠

炒燹

黃耆

蜜炙

石斛

去根
焙

覆盆子

白

茯苓

遠志

取皮

麥門冬

去心焙

枸杞子

右十二味各二兩為末用入山藥膏子丸如梧桐子
大每服五十九用溫酒調地黃膏子下日三服空心
食前

治吐血

出本草

右以紫蘇不限多少於大鍋內水煎令乾後去滓熬
膏以赤豆炒熟杵為末調煎為丸如梧桐子大酒下
三十九至五十九常服

治陰衄不止滴滴如赤豆汁口鼻俱出

右五倍子為細末每服二錢溫熱水調不據時候服



普濟方卷一百九十